



Con un incendio, Yo Muero



Imágenes extraídas de la Guía de Campo editada y publicada por la Corporación Chilena de la Madera: "Fauna de los Bosques Templados de Chile. Guía de Campo de los vertebrados terrestres." de Celis-Diez JL, S Ippi, A Charrier & C Garín (2011).



@altoincendios
Altoincendiosforestales
www.corma.cl



Echinopsis bolligeriana Mäeçhler & Walter 2003

Habita en la zona costera de la Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins en los riscos o partes planas de los acantilados costeros, por lo menos así han sido las poblaciones que hemos visitado, no sabemos si alguna vez estuvieron más al interior, ya que toda la zona está con plantaciones agrícolas y forestales.

Péndulo ramificando desde la base y formando matorrales densos. Tallos de 1 a 2 m de largo, 8 a 12 cm. de diámetro. Sus flores se abren lateralmente cerca del ápice del tallo; blancuzcas, tépalos externos rojizos, de 14 a 16 cm. de largo. Fruto: rojo, con restos del perianto unido, globoso, esférico.



Baja población.



Eriosyce curvispina (Colla) Kattermann 1994

Tiene una amplia distribución, tanto en la pre cordillera y en los cordones transversales, hasta la costa. Tiene una gran variedad de formas que ha tenido muchas denominaciones en la historia. En general se reconocen por las espinas curvas y sus flores de colores fogosos (rojas, naranjas y amarillas). Las poblaciones al este de Santiago, con grandes y múltiples flores de color rojo anaranjado, aguantan el crudo invierno con temperaturas bajo cero y nieve.

Aplanado a globular o cilíndrico, a veces con ramificaciones. Flores de 3 a 5 cm. y fruto pequeño, ovoide, que se elonga cuando madura, carnoso, de paredes gruesas, de color rojo cuando maduro, con poro basal.



Abundante población.



Maihuenia poeppigii (Otto ex Pfeifer) Philippi ex Schumann 1898

Esta especie habita en la precordillera del Biobío, La Araucanía y El Maule, sobre los 1.500 msnm.; la hemos encontrado cerca del Parque Nacional Laguna del Laja, formando grupos grandes, de hasta cientos de cabezas; viven en suelos arenosos y volcánicos que durante el invierno se cubren de nieve, situación a la que las plantas están acostumbradas.

Arbusto muy bajo (5 a 10 cm), achaparrado, fuertemente ramificado, formando cojines que alcanzan varios metros de diámetro. Con tallos cilíndricos, espinosos, de 2 a 7 cm de largo, con hojas verdes, aleznadas, blandas. Flores de 3 a 5 cm. de largo x 3 a 4 cm. de ancho, fruto amarillo con carne blanda, algo pegajosa.



Mediana población.



Echinopsis chiloensis ssp *litoralis* (Johow) Lowry 2003

Esta especie crece en localidades cercanas al mar; hacia el norte hasta los Vilos. Es muy abundante y se diferencia de la subespecie bolligeriana sólo por su fruto rojo.

Arbustivo que forma manchones densos de varios metros de ancho y de 1 a 2 m de alto, con tallos columnares, de 10 a 12 cm. de diámetro, ramificados desde la base, al comienzo erguidos, luego doblados, para después volver a erguirse. Los tallos recostados desarrollan fuertes raíces adventicias. Flores Laterales, de 12 a 14 cm. de longitud. Su fruto es una baya de color verde marrón de 3 a 4 cm. de diámetro. Semillas: pequeñas.



Mediana población.



Eriosyce aspillagae (Söhrens) Kattermann 1994

Habita en escasas locaciones en la Región del Libertador Bernardo O'Higgins y también en la Región del Maule. Vive cercano a la costa, en los acantilados en frente al mar.

De cuerpo Globoso a aplanado, solitario, ramificado y a veces formando cojines. De color verde a cafés quemados por el sol, los que pueden hundirse en la tierra durante los veranos extremadamente secos. Flores con forma de embudo, de 4 a 5,5 cm. de largo.

Esta especie está amenazada por el poblamiento humano, el pastoreo y labores agrícolas. Existe en baja cantidad.



Baja población.