

# Eulychnia iquiquensis

## ssp. iquiquensis

(Schumann) Britton & Rose 1920

**Sinónimo:**

*Cereus iquiquensis* Schumann 1904

*Eulychnia saint-pieana* Ritter 1964

**Etimología:**

*iquiquensis*: Epíteto geográfico que alude a la locación en Iquique.

**Distribución:**

Habita las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

**Descripción de la planta:**

**Cuerpo:** Ramificado o arborescente, de 2 a 7 m. de alto, ramificando desde la base o con un tronco corto de menos de 1,5 m., que se vuelven a dividir más arriba; ramas de 7 a 10 cm. de diámetro, verde grisáceo oscuro. **Costillas:** De 10 a 14, algo tuberculadas. **Areolas:** Grandes, apegadas, de 8 mm. de diámetro. Las nuevas provistas de fieltro corto y blanco. **Espinas:** De 10 a 20, muy desiguales, normalmente de 1 a 2 cm. de largo, pero llegando hasta los 12 cm. **Flores:** Subapicales, hasta de 6,5 cm. de largo x 6 cm. de ancho, diurnas, pericarpelo cubiertos con largos pelos blancos o marrón claro. De color blanco y rosado **Fruto:** Globoso, de 6 cm. de diámetro, con pelos persistentes; carnoso, ácido, es comido por pájaros.

**Hábitat:**

Se cree que antiguamente esta especie tenía una distribución más amplia y con ejemplares en mejor estado. Actualmente estas poblaciones son relictas y crecen sólo en lugares donde llega la camanchaca. Sin embargo las plantas están muy dañadas, con rastros de hospederos que han pasado y sus tallos están secos o muertos. Una de las características que la diferencia de las otras *Eulychnias*, es que florece sólo en la zona apical del tronco.

