

# Eriosyce napina

## ssp. riparia

(Ritter) Maechler & Walter 2006

### Etimología:

*riparia*: referente a que vive a orillas de una quebrada.

### Distribución:

Límite norte Región de Coquimbo, localidad de Trapiche.

### Descripción de la planta:

**Cuerpo:** Globular a subglobular, de 2 a 4 cm. de diámetro. Color gris-marrón. Ápice hundido cubierto con lana marrón. **Costillas:** De 10 a 12, disueltas en tubérculos. **Mamila:** De 3 a 6 cm. de diámetro, redondas. **Areolas:** Ovaladas. **Espinas:** Radiales principalmente, negruzcas, de 1 a 2 mm. **Flores:** Amarillas, de hasta 4 cm. de largo, con forma de embudo. Pericarpelo cubierto de lana marrón y cerdas naranjas. **Fruto:** Rojo, elongado. **Semilla:** Casi globular. De menos de 1x1 mm.

### Hábitat:

Esta especie la hemos visto en Trapiche, un pueblo al norte de La Serena. Sólo ahí la hemos encontrado, viviendo muy cercana al poblado. Su hábitat está lejano al mar, pero aún así, la camanchaca logra penetrar en el valle y llegar donde está la pequeña población. Esta especie se diferencia de la *Eriosyce napina* ssp. *tenebrica* (con la que alguna vez ha sido confundida) por que tiene menor cantidad de costillas, las mamilas son más redondeadas, y tiene lanosidad café en el tubo floral y en el fruto.

