

Eriosyce odieri

(Lemaire ex Salm-Dyck) Kattermann 1994

Sinónimo:

Echinocactus odieri Lemaire ex Sal-Dyck 1935

Chilenia odieri (Lemaire ex Sal-Dyck) Bckeberg 1939

Chileobutia odieri (Lemaire ex Sal-Dyck) Ritter 1959

Neochilenia odieri (Lemaire ex Sal-Dyck) Backeberg

Echinocactus reichei Schumann 1903

Thelocephala reichei (Schumann) Ritter 1980

Etimología:

odieri: En honor al monseñor James Odieri, amante de las cactáceas, quien nació en París alrededor de 1850.

Distribución:

Región de Atacama. Habita en los alrededores de Copiapó.

Descripción de la planta:

Cuerpo: Crece a ras o bajo la superficie del suelo, de 2 a 5 cm. de diámetro, marrones a gris verdosas. **Costillas:** Disueltas en tubérculos, éstos de 4 a 6 mm. de diámetro, con quilla. **Espinas:** Normalmente sin espina central, a veces sólo una, de menos de 10 mm., rectas. De 6 a 12 radiales, de 2 a 5 mm. de longitud. **Raíz:** Corta, cónica, sin estrechamiento en el cuello. **Flores:** De 3 a 4 cm., amarillo pálido a rojo pálido. Areolas del fruto con lanosidad blanca y cerdas. **Fruto:** Elongado cuando madura. **Semilla:** 1 mm. marrón.

Hábitat:

Esta especie se encuentra viviendo por la costa desde el norte de Carrizal bajo hasta las cercanías de Caldera. Van variando, desde las más sureñas con menor cantidad de costillas y espinas a las más nortinas con mayor cantidad de éstas. Viven en planicies y laderas cercanas a la costa, en sustratos graníticos, a ras de suelo o incluso bajo éste. En épocas de floración es más fácil encontrarlas, por sus vistosas flores amarillas.

