


■ *Liolaemus curis* Núñez & Labra, 1985

Nombre común: Lagarto negro. *Black lizard*.



Etimología: Del mapudungún *curi* o *kurü*, que significa negro. Referido a la coloración melánica de algunos ejemplares.

Reconocimiento: Es de tamaño grande y abdomen abultado. La cola puede duplicar la longitud de su cuerpo. Su cuello es marcadamente plegado y es más ancho que la cabeza. Las extremidades son largas y fornidas. Las escamas dorsales son de pequeño tamaño, forma subtriangular, superficie quillada y disposición imbricada. Las escamas ventrales son de mayor tamaño, redondeadas, imbricadas y de superficie lisa. Solo los machos presentan dos o tres poros precloacales, aunque existen individuos hasta con cinco poros y otros en los que están ausentes. Su coloración es variable, existiendo individuos de tonos café o café amarillento con series de manchas negras de disposición transversal de diversos tamaños que pueden extenderse desde la región paravertebral hasta el área superior de los flancos. El centro de su espalda suele ser más clara que el resto de su dorso y carece de banda occipital melánica. Algunos individuos son completamente negros. El vientre suele presentar tonalidades grisáceas.

Distribución: Es endémica de la Cordillera de los Andes en la Región de O'Higgins. Se registra en las Termas del Flaco, en el Río Damas y en el estero Los Humos, entre 1.520 y los 3.000 msnm.

Historia natural: De hábito saxícola, prefiere los matorrales rocosos. Tímida, muestra un período de actividad bimodal con máximos en mediodía y cercano a las 17 hrs. Cuando es capturada emite un chillido similar a *L. chiliensis*. Su reproducción es vivípara. Insectívora, se alimenta principalmente de himenópteros (hormigas del género *Camponotus*) y dípteros en menor proporción.

