


■ *Liolaemus leopardinus* Müller & Hellmich, 1932

Nombre común: Lagarto leopardo. *Leopard lizard*.



Etimología: Referido a su cuerpo provisto de manchas, similar al leopardo.

Reconocimiento: EEs de tamaño grande y aspecto fornido. La cola llega a medir un poco más de una vez y media la longitud del resto del cuerpo. La cabeza es más larga que ancha y el cuello, fuertemente plegado, en ocasiones, puede llegar a ser más ancho que la cabeza. Las extremidades son largas y de aspecto robusto. Las escamas dorsales son de tamaño pequeño, subtriangulares, de disposición subimbricada a imbricada y superficie quillada. Ventralmente, las escamas alcanzan un mayor tamaño, son redondeadas, lisas e imbricadas. Solo los machos pueden presentar dos poros precloacales, aunque algunos individuos carecen de estos. El colorido general es variable, pudiendo ser café amarillento, café oliváceo o café blanquecino cremoso. En la cabeza se distribuyen numerosas manchas negras irregulares. El dorso presenta una gruesa línea vertebral negra, en ocasiones entrecortada, y a ambos lados se distribuyen hileras de manchas café oscuras o negras. Los flancos son de un tono café más oscuro o negruzco. El vientre es grisáceo oscuro con manchas negras. En los ejemplares juveniles, el estampado característico suele ser más marcado que en los adultos.

Distribución: Es endémica de la Cordillera de los Andes de Chile central; en la zona altoandina desde el Valle Rieillos, en la Región de Valparaíso, hasta El Colorado, en la Metropolitana, entre 1.800 y 2.700 msnm. Hay registros en el valle del Río San Francisco, Cerro Plomo, valle de Yerba Loca y Farellones.

Historia natural: Habita laderas rocosas, construyendo sus cuevas bajo grandes piedras o en las cercanías de estas y de vegetación. Omnívora, consume insectos y flores. Es tímida, pero se defiende fuertemente al ser capturada. Es más activa en las horas de mayor temperatura. Es de reproducción vivípara.

