


■ *Liolaemus pictus* (Duméril & Bibron, 1837)

Nombre común: Lagartija pintada, Lagartija arborícola del Sur. *Painted lizard.*



Etimología: Del latín *pictus* ("pintado"), hace referencia a los vistosos coloridos de algunos ejemplares.

Reconocimiento: Es de tamaño mediano y la cola alcanza un poco más de una vez y media el largo del cuerpo. Cabeza más larga que ancha con hocico aguzado. El cuello es plegado y presenta escamas granulares y yuxtapuestas. Las escamas dorsales son redondeadas, pequeñas, levemente quilladas y subimbricadas a imbricadas. Ventralmente, estas son de mayor tamaño, redondeadas, lisas e imbricadas. Solo los machos presentan tres poros prelocales. Presenta un patrón compuesto por bandas supraoculares claras, acompañadas por manchas triangulares melánicas zigzagueantes, las que también abarcan la banda occipital. La coloración es muy variable; existen ejemplares de tonos oscuros pardos o café oliva y otros con escamas amarillas, anaranjadas, rojas, verdes y/o azules; los ejemplares más coloridos están hacia el sur. Los flancos se encuentran manchados de negro y pueden tener escamas de color verdoso amarillento. El vientre por lo general es blanco grisáceo con tonos anarajandos en los costados abdominales.

Distribución: Se encuentra desde el norte de la Región del Biobío hasta la Región de Aysén, entre 0 y 1.700 msnm. También está presente en Argentina.

Historia natural: En algunas localidades presenta hábitos arborícolas, prefiriendo bosques de *Nothofagus spp.*, mientras que en otros lugares se asolea directamente en el suelo o sobre rocas, bajo las que se esconde. Es omnívora, en algunas poblaciones predomina el consumo de frutos, mientras que en otras se alimenta casi exclusivamente de invertebrados tales como dípteros, homópteros y arañas. De reproducción vivípara, pare de tres a cuatro crías. Territorial, en los árboles desplaza a mayor altura a *L. tenuis*.

