


■ *Liolaemus lemniscatus* Gravenhorst, 1838

Nombre común: Lagartija lemniscata. Lagartija común. *Ribboned lizard*.



Etimología: *Lemniscatus* proviene del griego y quiere decir “decorado con cintas”. Referido a su patrón de coloración compuesto por bandas longitudinales.

Reconocimiento: Es de tamaño pequeño y de aspecto esbelto. La cola puede llegar a duplicar la longitud del cuerpo. La cabeza es triangular y el cuello no presenta pliegue. Las extremidades son cortas. Las escamas dorsales son de tamaño grande, lanceoladas, con quilla fuerte terminada en mucrón e imbricadas. Las ventrales son un poco más grandes, redondeadas, lisas e imbricadas. Solo los machos presentan dos a tres poros precloacales. La coloración es bastante variable, aunque en general el dorso es café, con un patrón conformado por una banda occipital café amarillenta, la que se extiende desde la nuca hasta la base de la cola, y lateralmente, un par de bandas supraoculares y suboculares blanquecinas. La cabeza generalmente es de un color más grisáceo en relación a la banda occipital. Entre la banda occipital y las supraoculares se encuentran numerosas manchas paravertebrales negruzcas y rectangulares, que en los machos suelen estar acompañadas en la parte posterior por escamas celestes. Entre las bandas supraoculares y suboculares presenta manchas rectangulares similares, aunque menos notorias, que pueden estar unidas con las paravertebrales. La zona baja de los flancos tiene coloración amarillenta, o rojiza en algunos machos, y el vientre es blanquecino grisáceo.

Distribución: Se encuentra desde el norte de Ovalle, Región de Coquimbo, hasta Melipeuco, en la Región de la Araucanía, entre 0 y 2.100 msnm. Hay registros en Parque Nacional La Campana, Parque Nacional Río Clarillo, Altos de Cantillana, Parque Nacional Las Palmas de Cocalán, Reserva Nacional Río Los Cipreses, Santuario de la Naturaleza Alto Huemul, Parque Nacional Radal Siete Tazas, Reserva Nacional Los Ruiles, Reserva Nacional Los Bellotos del Melado, Reserva Nacional Los Queules, Reserva Nacional Ñuble, Parque Nacional Nahuelbuta, Parque Nacional Conguillío, entre muchas otras localidades. También presente en Argentina.

Historia natural: Se encuentra en distintos ambientes a lo largo y ancho de su distribución, en especial matorrales, espinales y praderas. No es territorial. Escapa de sus depredadores, ocultándose entre los pastos. Es ovípara, su período de apareamiento comienza en septiembre y a fines de octubre la hembra deposita tres a cuatro huevos elípticos, que se incuban sin protección parental. Se caracteriza por ser una ágil cazadora de insectos.

