


■ *Liolaemus moradoensis* Hellmich, 1950

Nombre común: Lagartija de El Morado. *El Morado lizard*.



Etimología: Referido a la Laguna del Morado, "*terra typica*".

Reconocimiento: Es de tamaño pequeño, la cola puede duplicar la longitud del cuerpo. La cabeza es más larga que ancha y el cuello es levemente plegado. En el dorso del cuerpo las escamas son sublanceoladas, fuertemente quilladas e imbricadas. Las escamas del vientre son de tamaño similar, redondeadas, imbricadas y de superficie lisa. En los machos se pueden observar dos poros prelocales, ausentes en las hembras. El colorido de fondo es oliváceo o verdoso turquesa. La cabeza, más clara, tiene pequeñas manchas negras de disposición irregular. Su patrón de coloración se conforma por dos bandas supraoculares claras, las que convergen hacia la cola, entre las que se aprecian líneas negras transversales orientadas hacia posterior en forma de V, fusionándose hacia la cola. En algunos individuos casi no se aprecia este patrón de coloración y en cambio presentan tono verde o café amarillento bastante homogéneo y extendido por gran parte del dorso. El colorido del vientre es verdoso grisáceo.

Distribución: Es endémica de Chile central, en el sector montañoso del Cajón del Maipo en la Región Metropolitana, entre 900 y 4.000 msnm. Ha sido registrada en el Río Olivares, Termas El Plomo, Embalse El Yeso, Laguna Negra, Cerro Morado, Baños Morales, Baños Colina, Laguna del Morado, Lo Valdés y El Manzano.

Historia natural: Está asociada a sistemas hídricos de altura, tales como vegas y esteros cordilleranos. Habita preferentemente sectores con vegetación herbácea o arbustiva. Se asolea sobre piedras o directamente sobre el suelo. Frente a amenazas se esconde bajo piedras o en la base de arbustos.

