


■ *Liolaemus pseudolemniscatus* Lamborot & Ortiz, 1990

Nombre común: Lagartija lemniscata falsa. *Fake lemniscata lizard.*



Etimología: Del griego *pseudo* ("falso") y *lemniscatus* ("decorado con cintas"). El nombre se refiere a que pareciera ser *L. lemniscatus* por la coloración y su similitud morfológica.

Reconocimiento: El tamaño es pequeño y su aspecto esbelto, siendo menores las hembras. La cola puede duplicar la longitud del cuerpo. La cabeza es más larga que ancha y su cuello ligeramente plegado. Las escamas del dorso de su cuerpo son de forma lanceolada, gran tamaño, de superficie quillada y de disposición imbricada. Las escamas ventrales tienen similar tamaño, son redondeadas, lisas e imbricadas. Solo los machos tienen dos a tres poros precloacales. Poseen dimorfismo sexual evidente. El patrón de coloración de los machos es difuso, presentando un fondo café amarillento con una banda occipital grisácea poco notoria que se extiende por la cola, la que está acompañada de algunas manchas negras de disposición transversal. Las hembras poseen coloración cafésosa con un patrón notorio compuesto por una banda occipital de color gris, bandas supraoculares y suboculares de color amarillento, entre las que se disponen manchas negras y rectangulares, acompañadas de algunas escamas blancas en la parte posterior. La cabeza generalmente presenta un color más café rojizo, en relación al cuerpo. El vientre es gris blanquecino y en el macho presenta tintes amarillentos o anaranjados. En la región gular poseen algunas estrías negras.

Distribución: Es endémica de Chile central, en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, entre 25 y 2.000 msnm. En la Región de Valparaíso se registra en Hierro Viejo, al sur de Petorca, Alicahue y Vilcuya, en sectores precordilleranos de la comuna de Los Andes. Mientras que en la Región Metropolitana se ha identificado en la cordillera de Santiago, en el Arrayán y en Altos del Naranjo.

Historia natural: Habita en costas, valles centrales y sectores precordilleranos con presencia de piedras, arbustos y/o árboles. Se asolea sobre piedras o en el suelo, cerca de arbustos. Al ser incomodada, busca resguardo bajo arbustos o piedras. Es insectívora. Su reproducción es ovípara, la hembra deposita de 2 a 3 huevos.

