



QUELTEHUE



Nombre científico:

Vanellus chilensis.

Nombre común:

Queltehue, Treguel, Tero, Terotero, Teruteru.

Clasificación:

Familia Charadriidae.

Características: Se mueve por el suelo y nunca se posa en los árboles. Vive solo, en pareja o en pequeñas bandadas. Es agresivo y ruidoso. Su época de reproducción es muy temprana, comenzando a principios de julio. Durante esta época se vuelven muy celosos y agresivos, cuidando la nidada con los polluelos. Ataca a los intrusos, incluidas a las personas, con vuelos en picadas, rasantes y un grito fuerte similar a “tek-tek-tek”. Nidifica en el suelo que suele cubrir con algunos pastos secos. Sus crías son autófagas. De colores muy mimetizados con el medio, son difíciles de ver.

Tamaño: 35 a 37 cm.

Aspecto físico: Frente, garganta y pechos son de color negro intenso que contrasta fuertemente con el abdomen blanco. La parte superior tiene un color gris-verdoso con brillo metálico. En la nuca sobresalen algunas plumas negras, largas y finas. Al volar destacan en sus alas extendidas los colores blanco por dentro y negro por fuera. La cola es blanca con una ancha banda negra. Las patas son relativamente largas y de color rosado. Su pico es de color rojo con punta negra. Ojos rojos.

Alimentación: Básicamente insectos y algunas semillas.

Biología: Habita las orillas de lagos, lagunas y tranques, campos arados, praderas húmedas y secas, extensiones de pasto en ciudades, hasta los 2.600 m.s.n.m. No entra en bosques o zonas de matorrales altos.

Distribución geográfica: Desde Copiapó a Chiloé. Se han visto en Antofagasta.