

Blechnum penna-marina (Poiret) Kuhn

BLECHNACEAE

Nombre vulgar: Pinque

Hierba perenne con rizoma erecto a veces algo rastrero, subterráneo, estolonífero escamoso. Hojas pinnadas, dimorfas; pecíolos aglomerados, de color castaño oscuro hasta casi negro, de menos de la mitad del largo total de la hoha, con algunas escamas en la base; lámina estéril de 2 a 25 cm de largo, linear-lanceolada; raquis con escamas lanceoladas, de color café claro, esparcidas, caedizas; pinnas subopuestas, glabras, subcoriáceas a membranosas, de 3 a 5 cm de largo por 2 a 5 mm de ancho, oblongas a triangulares, obtusas a subagudas, dispuestas en forma perpendicular al raquis; hojas fértiles de hasta 3 veces más largas que las estériles; pinnas lineares a oblongas, más o menos curvas, bien separadas entre sí, a veces con un lóbulo basal. Soros en cenosoros continuos, cubriendo casi toda la superficie inferior de la pinna, indusio continuo.

Caracteres relevantes: Pinnas más o menos perpendiculares al raquis, no imbricadas, margen entero.

Posee una distribución austral circumpolar, con marcado carácter insular, se encuentra en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Australia e islas de los océanos Pacífico, Índico y Atlántico sur. En el país crece desde provincia de Malleco hasta el Cabo de Hornos desde el nivel del mar hasta los 1.700 m de altitud en la cordillera andina. Se encuentra en lugares húmedos, en el piso del bosque cerca de esteros y canales.



