

Lycopodium gayanum Remy

LYCOPODIACEAE

Nombres vulgares: Palmita, pimpinela

Hierba perenne con rizoma rastrero, epigeo o sólo un poco subterráneo, de 1,5 a 2,5 mm de diámetro. Ramas numerosas, levantadas, dorsiventrales, de 10 a 25 cm de alto, ramificadas 2 a 4 veces, de color verde amarillento. Hojas dimorfas, simples; unas dispuestas en forma dística, lanceoladas, gruesas, de 4 a 6 mm de largo, fuertemente divergentes, de ápice agudo; las otras dispuestas en doble fila, lineares, de la mitad del largo de las anteriores, estipulares, adpresas a lo largo de la rama. Estróbilos solitarios, en el extremo de las ramas, pedunculados, de 2 a 5 cm de largo; pedúnculos, cuando maduros, de 0,5 a 5 cm de largo; esporofilos anchamente aovados, apiculados, de 3,5 a 4 mm de largo, margen escarioso.

Caracteres relevantes: Rizoma epigeo o sólo un poco subterráneo. Ramas dorsiventrales, con dos tipos de hojas. Estróbilos solitarios en el extremo de las ramas, pedunculados.

Nativa de Chile, Argentina y el Archipiélago de Juan Fernández, crece desde la provincia de Concepción hasta la Región de Aysén, desde cerca del nivel del mar hasta los 1.100 m de altitud.

Estado de conservación: Vulnerable.



Amenazado

