

Blechnum arcuatum Remy

BLECHNACEAE

Hierba perenne con rizoma erecto, escamoso. Hojas monomorfas, enteramente glabras, péndulas; pecíolos de más o menos 10 cm de largo, aglomerados, algo acanalados en el dorso, brillantes; lámina linear lanceolada, pinnada, de 30 a 150 por 3 a 7 cm; pinnas coriáceas, brevemente pecioluladas, falcadas, agudas en el ápice, auriculadas en la base, margen entero o ligeramente ondulado; pinnas distales imbricadas, hacia la base más separadas y gradualmente reducidas, reemplazadas por segmentos atrofiados más o menos punzantes. Soros reunidos en cenosoros que se encuentran próximos a la vena media; indusio linear, de borde entero y cubriendo casi totalmente al cenosoro.

Caracteres relevantes: Lámina linear-lanceolada, de hasta 1,5 m de largo. Cenosoros lineares, pegados a la vena media.

Crece en los bosques subantárticos de Chile y Argentina, en el país se conoce desde la provincia de Ñuble hasta la provincia de Última Esperanza, desde cerca del nivel del mar hasta los 1.300 m de altitud. Crece preferentemente alrededor de los saltos de agua y en los taludes de cerros muy húmedos.

Estado de conservación: Insuficientemente conocida.



Amenazado

