

Hymenophyllum falklandicum Baker

HYMENOPHYLLACEAE

Hierba perenne, epífita, con rizoma rastrero. Pecíolo de casi un tercio del largo total de la hoja, con escasos pelos en la inserción con el rizoma, liso; lámina pinnada a bipinnatífida, plana, totalmente glabra, linear-lanceolada, de 2 a 4 cm de largo por 0,7 a 1,2 cm de ancho; pinnas alternas, oblicuas, especialmente las apicales, separadas por espacios de 4 mm; raquis flexuoso, finamente alado; últimos segmentos con el margen dentado, de 3 a 12 mm de largo por 1 mm de ancho, todos dirigidos hacia el ápice. Soros generalmente 1 por pinna, raro 2 ó 3, fuertemente arqueados en la base, insertos en segmentos muy reducidos; indusios bivalvos, oval-lanceolados, enteros, partidos hasta dos tercios de su longitud; receptáculo cilíndrico, con tendencia a claviforme, alcanzando la mitad de la longitud del indusio.

Caracteres relevantes: Hojas con la lámina pinnada a bipinnatífida, totalmente glabra; últimos segmentos dirigidos hacia el ápice, con el margen dentado. Soros generalmente 1 por pinna, fuertemente arqueados en la base, protegidos por indusios bivalvos, enteros.

Nativo de Chile y Argentina, en el país se encuentra desde la provincia de Biobío hasta la provincia Antártica Chilena, entre los 15 a 1.600 m de altitud. También en el Archipiélago de Juan Fernández.

Estado de conservación: Vulnerable.



Amenazado

