

# *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. *var. apiiformis* (Gand.) C. Chr.

WOODSIACEAE

Hierba perenne con rizoma corto, rastrero, cubierto de escamas deltoideo-lanceoladas. Hojas bipinnadas-pinnatifidas, de 10 a 40 cm de largo por 2 a 8 cm de ancho; pecíolos cilíndricos, flexibles, con dos haces vasculares en la base, aglomerados, de un quinto del largo total de la hoja; lámina aovado-lanceolada, herbácea, pinnas aovadas a aovado-lanceoladas, subopuestas a alternas; últimos segmentos glabros, cortamente peciulados especialmente los basales, el resto adnados al raquis, lobulados; venas rematando en los lóbulos o en las hendiduras del margen. Soro redondeado, dorsal sobre la vena. Indusio aovado o lanceolado, frecuentemente lacerado, glandular.

**Caracteres relevantes:** Plantas herbáceas, lámina bipinnada-pinnatifida. Soro redondeado, dorsal sobre la vena. Indusio aovado o lanceolado.

Se encuentra en casi toda la extensión de Chile continental, siempre en lugares protegidos y húmedos, desde cerca del nivel del mar hasta los 3.500 m de altitud. Además crece en el Archipiélago de Juan Fernández, Argentina, Kerguelen y Nueva Zelanda.



