

Asplenium monanthes L.

ASPLENIACEAE

Hierba perenne con rizoma cortamente rastroso, cubierto de escamas linear-lanceoladas, castaño oscuras a negruzcas, a menudo con el margen castaño claro. Hojas lineares, numerosas, de 15 a 35 cm de largo; pecíolo y raquis glabros, castaño oscuros, brillantes; lámina pinnada, linear, glabra, gradualmente reducida hacia la base, con 20 a 30 pares de pinnas; pinnas coriáceas, alternas trapezoidales, de 0,5 a 1,5 cm de largo, borde superior y externo dentado, venas poco visibles que terminan cerca del margen. Soros en número de 1 a 2, cercanos al margen inferior; indusio lateral, verde pálido a blanquecino, subentero, persistente.

Caracteres relevantes: Hojas de hasta 35 cm de largo, pinnadas. Pinnas coriáceas, trapezoidales. Soros protegidos por un indusio lateral, alargado.

Vastamente distribuido en África. En el continente americano se extiende desde Arizona a través de México hasta Sudamérica; es una especie común especialmente en sitios altos; también en Jamaica y Hawai. En Chile se encuentra desde la provincia de Cautín hasta la provincia Última Esperanza, entre los 5 y 200 m de altitud.

Estado de conservación: Vulnerable.



Amenazado

