

# *Gleichenia quadripartita* (Poiret) T. Moore

GLEICHENIACEAE

Hierba perenne con rizoma rastrero poco escamoso, a veces completamente glabro. Hojas de 25 a 40 cm de largo, con ramificación dicótoma (yema central no desarrollada); pinnas de 8 a 15 cm de largo, lanceoladas; pecíolos poco escamosos, separados, lisos, de color pardo; últimos segmentos de 12 a 15 mm de largo, coriáceos, planos, con el margen marcadamente reflejo, pero no enrollado, dejando los soros al descubierto; cerca de las dicotomías no hay espacios sin pínulas, a veces la pínulas están en un solo lado del eje; raquis y venas cubiertos de escamas parduzcas. Soros con 3 a 4 (raro 5) esporangios, de color amarillento.

**Caracteres relevantes:** Hojas con ramificación dicótoma (la yema central no desarrollada). Soros con 3 a 4 esporangios, sin indusio, claramente visibles, no cubiertos por el borde revoluto del último segmento

Nativo de Chile y Argentina, también se encuentra en la isla Más Afuera del Archipiélago de Juan Fernández, en el país crece desde la provincia de Concepción hasta la provincia de Magallanes, desde cerca del nivel del mar hasta alturas medianas en la Cordillera de los Andes (800 a 1.800 m de altitud).



