

# *Sepyllopsis caespitosa* (Gaudich.) C. Chr.


HYMENOPHYLLACEAE

Hierba perenne, epífita o terrestre, densamente cespitosa, de 1,5 a 5 cm de largo. Rizoma rastrero, castaño oscuro, provisto de pelos rojizos. Pecíolo de 0,2 a 0,6 cm de largo, con pelos rojizos en la parte dorsal; lámina pinnada, oval-oblonga; pinnas generalmente alternas, a veces imbricadas, oblongas, obtusas en el ápice, margen entero; raquis y venas con numerosos pelos rojizos en la cara inferior. Soros terminales o laterales, ubicados en las pinnas apicales; indusio infundibuliforme, algo comprimido, partido hasta casi la mitad de su longitud, labios suborbiculares, marcadamente dentados, con pelos rojizos semejantes a los del raquis y venas; receptáculo claviforme, de 2,5 a 3 mm de largo, sobrepasando el indusio a veces por casi un tercio de su longitud, cubierto de esporangios sólo en el tercio superior.

**Caracteres relevantes:** Hojas muy delgadas; pecíolo con pelos rojizos en la parte dorsal; lámina pinnada, con pelos rojizos en el raquis y en las venas. Soros cubiertos por un indusio infundibuliforme, con pelos rojizos.

Nativo de Chile y Argentina, en el país se encuentra desde la Región de la Araucanía hasta la provincia Antártica Chilena, entre los 20 a 1.700 m de altitud.

**Estado de conservación:** Insuficientemente conocida.



Amenazado

