

Adiantum chilense Kaulf.

ADIANTACEAE

Nombres vulgares: Palito negro, culantrillo, doradilla

Hierba perenne con un rizoma rastrero, de 2 mm de diámetro. Hojas de 15 a 40 cm de largo, rara vez más grandes; pecíolo de 1 mm de diámetro, café negruzco, brillante, de la mitad del largo total de la hoja; lámina deltoide, bipinnada a tripinnada. Últimos segmentos glabros, peciolulados, coriáceos, subtrapezoidales o reniformes, en la base a veces cuneados, el borde superior dividido en 4 a 7 lóbulos anchos, poco profundos, ligeramente denticulados; venas numerosas, divididas 1 ó 2 veces, flabeladas. Soros marginales, reniformes o algo alargados, de 1 a 3 mm de largo, protegidos por el indusio originado por el margen del segmento, que posee una escotadura hemisférica central.

Caracteres relevantes: Últimos segmentos de la hoja glabros, con venación flabelada. Soros reniformes, en la cara interna del margen reflejo.

En medicina popular las hojas se usan en decocción con miel de abejas y se administra como pectoral, aperitivo y emenagogo. Es una planta ornamental de interior y jardines.

Nativo de Chile y Argentina, en el país crece desde la provincia de Limarí hasta la provincia de Magallanes, desde el nivel del mar hasta los 1.700 m de altitud en la cordillera andina, también se encuentra en las Islas de Juan Fernández. Vive en el margen y dentro del bosque, e incluso en terrenos expuestos a sol, pero siempre donde exista agua disponible para sus raíces.



