

Blechnum chilense (Kaulf.) Mett.

BLECHNACEAE

Nombres vulgares: Costilla de vaca, quilquil

Subarbusto perenne con rizoma erecto, escamoso, de 3 a 5 cm de diámetro (en ejemplares grandes puede formar un pequeño tronco de 50 cm de alto por 15 cm de diámetro). Hojas dimorfas; las estériles de 0,5 a 1,5 m de largo por 10 a 40 cm de ancho; pecíolo de 20 a 40 cm de largo, algo leñoso, en la base con escamas anchas, de color castaño claro; lámina pinna-da, de contorno oval-lanceolado; pinnas de 5 a 20 cm de largo por 1 a 3 cm de ancho, agudas, brevemente pecioluladas, base cordada; hojas fértiles algo más largas que las estériles, con pinnas de 3 a 10 mm de ancho, dirigidas hacia el ápice. Soros cubriendo integralmente la cara abaxial; indusio submarginal, continuo.

Caracteres relevantes: Pinnas cortamente pecioluladas. Base del pecíolo con escamas anchas de color castaño claro. Se usa como planta ornamental de jardines, siempre que exista bastante humedad en el suelo.

Nativa de Chile y Argentina, en el país se encuentra desde la costa de la provincia de Limarí y región andina de la provincia de Santiago hasta la provincia de Magallanes. También crece en el Archipiélago de Juan Fernández. Helecho de lugares muy húmedos, a lo largo de cursos de agua y es característico en pantanos formando asociaciones con *Gunnera tinctoria* (pangue). Suele invadir el interior de bosques sombríos, especialmente en las quebradas.



