

# *Sephanoides sephaniodes*


Picaflor chico, *pinda*



**Orden:** Apodiformes

**Familia:** Trochilidae

- ▶ **Origen:** nativo.
- ▶ **Distribución de la especie en Chile:** desde la Región de Antofagasta hasta la Isla Navarino en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
- ▶ **Hábitat:** bosques y matorrales nativos. También en parques y jardines en la ciudad.
- ▶ **Estado de conservación en Chile:** sin clasificar.
- ▶ **Amenazas a su conservación:** no presenta amenazas directas inmediatas, sin embargo son susceptibles a la pérdida y degradación del hábitat.



**Descripción e historia natural:** de pequeño tamaño e inconfundible color verde metálico. Tiene además la garganta blancuzca con pintas negras y una mancha blanca detrás del ojo. El macho se diferencia de la hembra por una brillante mancha roja iridiscente en la frente y por un comportamiento altamente territorial. Su vocalización comienza con una o dos notas más espaciadas seguidas de agudos trinos. Se desplaza velozmente produciendo un fuerte "zumbido" producido por su rápido aletear. Dado que su principal alimento es el néctar de las flores, es un importante polinizador de muchas especies de plantas, particularmente de aquellas que tienen flores en la gama de los rojos y rosados, como por ejemplo el notro, la chaquihua y el copihue. El picaflor se encuentra durante todo el año hasta la Región de Los Lagos, lo cual está asociado a plantas que florecen en invierno, como el voqui y el quintral. También consume insectos. Se reproduce durante la primavera, para lo cual construye un nido de musgos y plumas, entrelazadas entre algunas ramitas de quila, arbustos o enredaderas. Coloca dos huevos blancos pequeños y sólo la hembra cuida del nido y los polluelos.

▶ **Medidas de manejo para su conservación:** conservar los bosques y matorrales nativos. Conservar vegetación de quebradas al interior de las plantaciones. Fomentar iniciativas de educación ambiental.