

# *Rhinella rubropunctata*


Sapo de manchas rojas



**Orden:** Anura

**Familia:** Cycloramphidae

- ▶ **Origen:** endémico de los bosques templados australes de Chile y Argentina.
- ▶ **Distribución de la especie en Chile:** desde Angol en la Región de La Araucanía hasta la Provincia de Palena en la Región de Los Lagos. Distribución muy fragmentada.
- ▶ **Hábitat:** bosques y matorrales nativos, especialmente de *Nothofagus*. Presencia en claros y zonas con vegetación semi-densa.
- ▶ **Estado de conservación en Chile:** En Peligro.
- ▶ **Amenazas a su conservación:** pérdida, degradación y fragmentación del bosque nativo por actividades silvoagropecuarias.



**Descripción e historia natural:** sapo de tamaño mediano a grande, robusto y grueso. Cabeza grande con hocico corto y aguzado. Piel seca y gruesa, completamente cubierta por protuberancias gruesas de coloración rojiza. La región dorsal es de color blanco ceniciento o gris oscuro con manchas negras mientras que la región ventral es negra con reticulaciones blancas. Las glándulas parótidas están bien desarrolladas, redondas y con pigmentación rojiza. Los individuos post metamórficos son de coloración negra con puntos negros y patas amarillo anaranjado. Es un anfibio de hábitos nocturnos, que se esconde durante el día bajo refugios de troncos caídos, hojarasca y piedras. La reproducción se produce en época de primavera y verano en cuerpos de aguas temporales, en zonas abiertas o dentro del bosque, zonas húmedas adyacentes a ríos, lagos o pantanos. Los huevos son puestos en largos rosarios o cordones.

**Medidas de manejo para su conservación:** conservar el bosque nativo, especialmente la vegetación ribereña y el sotobosque. Conservar cuerpos de agua y evitar su modificación (por ejemplo represas). Mantener el sotobosque y la vegetación ribereña de especies nativas en plantaciones forestales. Fomentar estudios científicos y monitoreos. Fomentar iniciativas de educación ambiental.