

Carduelis barbata


Jilguero, *chidüf*, *quechan*



Orden: Passeriformes

Familia: Fringillidae

- ▶ **Origen:** nativo.
- ▶ **Distribución de la especie en Chile:** desde la Provincia de Copiapó en la Región de Atacama hasta la Isla Navarino en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
- ▶ **Hábitat:** bosque nativo, especialmente bosques abiertos y bordes de bosque. Matorrales. También en parques y jardines en la ciudad.
- ▶ **Estado de conservación en Chile:** sin clasificar.
- ▶ **Amenazas a su conservación:** no presenta amenazas directas inmediatas, sin embargo son susceptibles a la pérdida y degradación del hábitat y a la presencia de depredadores exóticos. Indirectamente, se ven afectados por un aumento de las poblaciones de mirlo, los cuales parasitan sus nidos.



Descripción e historia natural: el jilguero macho es de color amarillo verdoso, con el dorso grisáceo y la cabeza y garganta negras. En las alas presenta bandas negras intercaladas con amarillas. La hembra tiene una coloración similar, pero sin la cabeza y garganta negra. Su fuerte pico cónico es típico de las aves granívoras. Es una especie muy gregaria, que suele formar bandadas, a veces muy numerosas, con más de 40 individuos. El macho emite un alegre y musical canto, que suele ser muy largo y bastante variado. Buscan su alimento en el suelo, pero también en arbustos y árboles grandes, y no es raro observarlos comiendo apoyados tenuemente en alguna delgada ramita a pocos centímetros del suelo. Se alimenta principalmente de semillas. Se reproducen durante la primavera, para lo cual construyen un nido abierto tipo copa, donde colocan de tres a seis huevos de color celeste claro.

▶ **Medidas de manejo para su conservación:** conservar los bosques y matorrales nativos. Evitar la introducción de depredadores exóticos. Conservar vegetación de quebradas al interior de las plantaciones. Fomentar iniciativas de educación ambiental.