

# *Aphrastura spinicauda*


Rayadito, *yiqui-yiqui*



**Orden:** Passeriformes

**Familia:** Furnariidae

- ▶ **Origen:** endémico de los bosques templados australes de Chile y Argentina.
- ▶ **Distribución de la especie en Chile:** desde el Parque Nacional Bosque Fray Jorge en la Región de Coquimbo hasta la Isla Navarino en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
- ▶ **Hábitat:** bosque nativo. Ocasionalmente en matorrales densos.
- ▶ **Estado de conservación en Chile:** sin clasificar.
- ▶ **Amenazas a su conservación:** Pérdida y degradación del bosque nativo, particularmente por la disminución del número de árboles grandes y antiguos que proveen cavidades para nidificar.



**Descripción e historia natural:** el rayadito es un ave pequeña, cuyos rasgos más característicos son la presencia de una ceja de color canela sobre la franja negra que cubre el ojo, el pecho claro casi blanco y una larga cola que suele llevar erecta, destacándose dos plumas en punta. Posee un llamado de alarma muy audible y repetitivo que emite mientras se acerca a su depredador, o dado el caso, a un observador humano. Se alimentan principalmente de insectos, aunque pueden también consumir en menor proporción material vegetal. Durante la temporada invernal su conducta es gregaria formando bandadas que pueden incluir individuos de otras especies. Al comenzar la temporada reproductiva estas bandadas se disuelven y se forman las parejas, que construyen sus nidos en cavidades naturales de los árboles. La hembra pone normalmente cinco huevos que son incubados alternadamente por ambos padres durante aproximadamente 16 días. Los polluelos abandonan el nido entre los 16 y 23 días de vida.

▶ **Medidas de manejo para su conservación:** conservar los bosques y matorrales nativos, y mantener la presencia de árboles antiguos y/o grandes. Conservar vegetación de quebradas al interior de plantaciones. Fomentar iniciativas de educación ambiental.