

Buteo albigula


Aguilucho chico



Orden: Falconiformes

Familia: Accipitridae

- ▶ **Origen:** nativo.
- ▶ **Distribución de la especie en Chile:** desde Vallenar en la Región de Atacama hasta Caleta Tortel en la Región de Aysén.
- ▶ **Hábitat:** especialista de bosque, pero puede extender su área de caza a áreas abiertas.
- ▶ **Estado de conservación en Chile:** Rara.
- ▶ **Amenazas a su conservación:** pérdida y degradación del bosque nativo, particularmente por la disminución del número de árboles grandes necesarios para construir su nido.



Descripción e historia natural: es un ave rapaz de mediano tamaño y coloración marrón, con el pecho blanco con estrías verticales marrones. Es muy difícil de observar y está escasamente estudiada. Normalmente es un ave silenciosa, de hábito diurno. Se alimenta tanto de vertebrados como de invertebrados. Entre los primeros incluye pequeñas aves como rayaditos, chercanes y jilgueros, roedores y lagartijas. Esporádicamente también incluye presas no tan pequeñas como liebres y cachañas. Si bien su rango de distribución llega hasta Venezuela y Colombia, sólo se han registrado eventos reproductivos en los bosques de Chile y Argentina, entre septiembre y abril. Sus nidos son plataformas de ramas cuyo diámetro fluctúa alrededor de los 70 cm. Pueden poner uno o dos huevos blancos, pero siempre crían un solo polluelo, el cual permanece en el nido durante unas seis semanas. Luego de reproducirse, tanto los juveniles como los adultos emprenden el viaje hacia el norte de Sudamérica.

▶ **Medidas de manejo para su conservación:** conservar el bosque nativo, particularmente árboles antiguos y/o grandes. Fomentar iniciativas de educación ambiental.