

Milvago chimango


Tiuque, triwkü, triuki



Orden: Falconiformes

Familia: Falconidae

- ▶ **Origen:** nativo.
- ▶ **Distribución de la especie en Chile:** desde la Provincia de Copiapó en la Región de Atacama hasta la Isla Navarino en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
- ▶ **Hábitat:** bosque nativo, especialmente bosques abiertos y bordes de bosque. Matorrales y áreas abiertas, incluyendo zonas urbanizadas.
- ▶ **Estado de conservación en Chile:** sin clasificar.
- ▶ **Amenazas a su conservación:** no presenta amenazas directas inmediatas.



Descripción e historia natural: de menor tamaño que el traro, tiene una silueta y patrón de coloración similar, aunque parda en lugar de negra. La cera es muy pequeña y amarillenta. Pico grisáceo y fuerte. Son buenos caminadores y bastante gregarios, suelen andar en pequeños grupos. Emiten un fuerte grito seguido de otras notas ásperas y guturales. Son de hábito alimentario generalista y carroñero, alimentándose en gran proporción de insectos, algunos de los cuales son considerados plagas de cultivos. También depredan sobre huevos y polluelos de otras aves. Son frecuentes visitantes de basurales y zonas costeras. Construye su nido con ramas secas, donde pone dos o tres huevos de color crema con manchitas. Ambos sexos participan en las tareas parentales. El periodo de incubación se extiende por unos 35 días, y una vez que eclosionan, permanecen en el nido durante unas cinco semanas.



▶ **Medidas de manejo para su conservación:** conservar los bosques y matorrales nativos. Fomentar iniciativas de educación ambiental.