

Colorhamphus parvirostris


Viudita, *peutrén*, *lantu*



Orden: Passeriformes

Familia: Tyrannidae

- ▶ **Origen:** endémico de los bosques templados australes de Chile y Argentina.
- ▶ **Distribución de la especie en Chile:** desde el Parque Nacional Bosque Fray Jorge en la Región de Coquimbo hasta la Isla Navarino en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
- ▶ **Hábitat:** bosque nativo. Ocasionalmente se la puede oír en parques y jardines en la ciudad.
- ▶ **Estado de conservación en Chile:** sin clasificar.
- ▶ **Amenazas a su conservación:** pérdida y degradación del bosque nativo. Podría verse afectada por el calentamiento global, ya que se ha sugerido que habría ampliado su distribución en épocas recientes a latitudes más australes.



Descripción e historia natural: la viudita tiene una coloración parduzca con la cabeza casi negra, pecho grisáceo y abdomen amarillento. Tiene los ojos y el pico negro, este último rodeado de vibras que le sirven para cazar insectos en vuelo, al igual que otras especies de la misma familia. Emite un único y lastimero silbido desde la espesura del bosque, lo que le ha dado su nombre de viudita. Solitario y muy difícil de observar, ya que en general son también muy poco abundantes. Se alimentan principalmente de insectos, aunque también pueden consumir pequeñas semillas. Se reproducen desde octubre en adelante, construyendo un nido tipo copa de pequeño tamaño, a baja altura y bien camuflado entre densos arbustos o ramas de árboles. Ponen de dos a tres huevos blanquecinos con pintas de color rojizo.

▶ **Medidas de manejo para su conservación:** conservar el bosque nativo. Conservar vegetación de quebradas al interior de plantaciones. Fomentar iniciativas de educación ambiental.