

Atelognathus salai


Sapo



Orden: Anura

Familia: Ceratophrydae

- **Origen:** endémico de los bosques templados australes de Chile y Argentina.
- **Distribución de la especie en Chile:** Lago Jeinimeni en la Región de Aysén.
- **Hábitat:** bosque nativo. Especialmente, bosque achaparrado de ñirre y ecotono con estepa patagónica de altura y geografía de montañas abruptas.
- **Estado de conservación en Chile:** sin clasificar. Esta especie fue descrita recientemente, por lo que no cuenta con una categoría de conservación.
- **Amenazas a su conservación:** pérdida y degradación del hábitat por actividades ganaderas. Introducción de peces no nativos (salmónidos). Incendios forestales. Distribución restringida.



Descripción e historia natural: anfibio de tamaño pequeño, coloración moteada con manchas amarillas claras, y negras. Cabeza pequeña y hocico aguzado. Extremidades cortas y delgadas. Piel cubierta por pequeñas protuberancias o verrugas rojizas. Ojos protuberantes con iris dorado con reticulaciones irregulares oscuras. Vientre de coloración blanco grisáceo. Este anfibio ha sido encontrado en una laguna lateral al lago Jeinimeni, de aguas permanentes y forma elíptica, con 87 m de largo y 50 cm de profundidad. De actividad nocturna, de día se esconde bajo rocas y troncos caídos. Durante la noche se acercan al borde de la laguna. Durante los meses de enero se puede encontrar un gran número de juveniles escondidos entre los matorrales de mata negra. La reproducción se realiza en el mes de enero. Las hembras cantan con los machos en época reproductiva. Las larvas son de actividad crepuscular. Se desconoce gran parte de la biología y ecología de esta especie.

Medidas de manejo para su conservación: conservar el bosque nativo y mantener sotobosque de especies nativas en plantaciones forestales. Conservar cuerpos de agua al interior del bosque y plantaciones. Evitar la introducción de peces exóticos. Fomentar iniciativas de educación ambiental.