

Liolaemus chiliensis


Lagarto chileno, lagarto llorón



Orden: Squamata

Familia: Tropiduridae

- ▶ **Origen:** nativo.
- ▶ **Distribución de la especie en Chile:** desde la Provincia del Limarí en la Región de Coquimbo hasta la Provincia de Valdivia en la Región de Los Ríos. Desde 0 a 1900 msnm.
- ▶ **Hábitat:** bosques y matorrales nativos con abundante presencia de sotobosque.
- ▶ **Estado de conservación en Chile:** Insuficientemente Conocido.
- ▶ **Amenazas a su conservación:** pérdida y degradación del hábitat. Incendios forestales.



Descripción e historia natural: lagartija de tamaño grande y aspecto robusto, puede medir hasta 30 cm. Cola larga, más del doble de la longitud hocico-cloaca. Escamas del dorso dispuestas como tejas (imbricadas), grandes, triangulares lanceoladas y fuertemente quilladas, con puntas prolongadas que le confieren un aspecto espinoso. Color general verde oliváceo, con dibujo dorsal formado por una banda occipital de manchas oscuras que se disponen linealmente dejando entre sí espacios, delimitada por dos líneas supraoculares que se extienden hasta la cola. Garganta amarilla y región ventral blanco amarillenta. Juvenil café amarillento sin o con débil diseño. Especie terrícola de hábitos trepadores, encontrándose sobre arbustos o troncos caídos, menos frecuentemente sobre rocas. Al ser capturado emite un chillido agudo, similar a una “i” prolongada, lo que sucede más frecuentemente en las poblaciones de la zona central. Insectívoro y ovíparo, la hembra coloca entre siete y 14 huevos blancos amarillentos.

Medidas de manejo para su conservación: conservar bosques y matorrales nativos. Mantener sotobosque de especies nativas en plantaciones forestales. Evitar tala rasa. Fomentar iniciativas de educación ambiental.