

Liolaemus cyanogaster


Lagartija de vientre azul



Orden: Squamata

Familia: Tropiduridae

- ▶ **Origen:** nativo.
- ▶ **Distribución de la especie en Chile:** desde la Provincia de Cauquenes en la Región del Maule hasta la Región de Los Lagos incluyendo la Isla de Chiloé. Desde 0 a 1200 msnm.
- ▶ **Hábitat:** bosques y matorrales nativos, especialmente en el sotobosque. También presente en ambientes rurales y plantaciones forestales.
- ▶ **Estado de conservación en Chile:** Fuera de Peligro.
- ▶ **Amenazas a su conservación:** pérdida y degradación del hábitat, aunque se adapta relativamente bien en ambientes modificados por el hombre.



Descripción e historia natural: lagartija de tamaño mediano y aspecto fino, mide entre 16 y 18 cm. Cola más del doble de la longitud hocico-cloaca. Escamas del dorso triangulares alargadas, imbricadas y quilladas. Quillas en hileras longitudinales y paralelas, convergiendo hacia la base de la cola. Color de fondo variable, con formas café, verdes e intermedias. Diseño dorsal constituido por dos líneas supraoculares amarillentas bien definidas de dos escamas de ancho, que recorren el dorso hasta fusionarse en la zona caudal. Entre ellas una banda occipital (mediodorsal) del color del fondo, con manchas negras dispuestas en línea en la zona de contacto con las líneas supraoculares, las cuales están ausentes en las hembras. Machos con tonalidades metálicas en los flancos. Vientre de color verdoso, el cual adquiere tonalidades azulosas en líquidos de preservación, de donde viene su denominación específica. Se encuentra frecuentemente trepada en matorrales o en el suelo refugiada entre el matorral o sotobosque. De dieta insectívora, su reproducción es vivípara.

Medidas de manejo para su conservación: conservar el bosque nativo, especialmente el sotobosque. Mantener sotobosque en plantaciones forestales. Fomentar corredores de vegetación nativa en zonas rurales y ambientes urbanizados. Fomentar iniciativas de educación ambiental.