


# *Berberis actinacantha*

Martius

Michay

**Floración:** 

**Fructificación:** 

**Familia:** Berberidáceas.

**Origen geográfico:** Endémica de Chile.

**Distribución en Chile:** Regiones de Antofagasta a la de La Araucanía.

**Descripción:** Arbusto siempreverde de hasta 1 m de altura por similar diámetro. Ramas jóvenes verde grisáceas o castañas, pubescentes, con fisuras longitudinales, costillas y puntos negros, al envejecer; espinas con la base ancha y 3-5 ramificaciones. Hojas duras, casi redondeadas, reniformes, obovado-elípticas, fuertemente dentadas y espinescentes. Inflorescencia en racimos o umbelas; perigonio con 14 tépalos amarillos. Florece en primavera. Fruto, una baya negruzca, madura en verano.

**Hábitat:** Crece en laderas de cerros asoleados de exposición norte. Requiere suelos con buen drenaje, algo de humedad y nutrientes. Forma parte de las comunidades del matorral esclerófilo, que ocupa los sitios degradados.

**Propagación:** Se propaga por semillas, extraídas de frutos macerados y sembradas de inmediato en almácigos estratificados. De modo vegetativo se multiplica durante el verano, en cama fría, por esquejes apicales, tratados con hormonas para que enraícen.

**Utilización:** En jardines se planta aislado o formando parte de grupos con otros arbustos con los mismos requerimientos. Se cultiva también en macetas y jardineras de exposición norte. Soporta bien la sequía y las heladas y resiste plagas y enfermedades.

