

Vestia foetida

Hoffmans.

Huevil, chuplí, chuplin, palqui, echelcún, porotillo

Floración:   **Fructificación:** 

Familia: Solanáceas.

Origen geográfico: Endémica de Chile.

Distribución en Chile: Regiones de Valparaíso a Los Lagos.

Descripción: Arbusto siempreverde, de hasta 3 m de altura y similar diámetro. Ramas primero verticales, luego se curvan hacia el suelo. Hojas cortamente pecioladas, alternas o fasciculadas, semi-coriáceas, lanceolado-elípticas, base atenuada y ápice agudo, de color verde claro; al rozarlas desprenden un aroma desagradable. Flores solitarias, colgantes, amarillas, de hasta 4 cm de longitud; cáliz con 5 dientes poco marcados; corola tubular con 5 pétalos unidos hasta cerca del ápice, partes libres triangulares; estambres 5, más largos que la corola, pistilo con un estigma lobulado. Florece a fines de primavera y comienzos del verano. Fruto, una cápsula con numerosas semillas que maduran en verano.

Hábitat: Crece desde el litoral hasta la precordillera, en los claros de bosques o en quebradas, en suelos húmedos y en condiciones de semisombra. Crece en los bosques de roble y en los de tipo valdiviano, más húmedos.

Propagación: Por semillas, ya sea en almácigo estratificado en otoño o normal en primavera, conviene remojarlas por 3 a 4 días antes de sembrarlas. Vegetativamente se multiplica en cama fría durante el verano mediante esquejes subapicales con hormonas para que enraícen o en invierno, por estacas a las que se les elimina las hojas y se colocan en agua con enraizante por 24 o 48 hrs antes de plantarlas en el lugar definitivo.

Utilización: En jardines bajo árboles donde producirán efectos de luz por sus flores amarillas y pondrán un toque de elegancia con sus gráciles ramas, destacan mucho plantándolo en la cumbre de una pequeña elevación donde lucirán mejor sus flores y la curvatura de sus ramas. En medicina alternativa se usa como vermífugo y es recomendada para la fiebre tifoidea.



