## Berberis negeriana

## Tischler

## Michay, mechai



3 mm, madura en verano v otoño.



Familia: Berberidáceas.

Origen geográfico: Endémica de la Región del Bío Bío.

Distribución en Chile: Región del Bío Bío, provincia de Concepción.

Estado de conservación: especie clasificada como en peliaro crítico de extinción.

**Descripción:** Arbusto siempreverde, de hasta 1 m de altura. Ramas café grisáceas, sin espinas. Hojas lustrosas, más claras y lustrosas también por el envés, elípticas, 4,8 a 10 cm de largo v 1.3 a 4.2 cm de ancho, fuertemente aserradas con 6-16 dientes espinosos, rara vez enteras, nervaduras muy marcadas. Inflorescencia en racimos de hasta 12 flores: perigonio con 14 tépalos amarillos. Florece desde fines de primavera v durante el verano. Fruto oblongo, gris azulado, con estilo persistente de

Hábitat: Crece como sotobosque de Nothofagus obligua (roble). Vive sólo en las cercanías de Chiquayante y en el valle de Nonguén entre 200 y 300 msnm.

**Propagación:** Se propone propagarlo por semillas extraídas de frutos macerados imitando lo efectuado con otros Berberis ya que no hay experiencia al respecto. Se supone que vegetativamente se podría multiplicar por esquejes con las hojas cortadas a la mitad y por estacas, con aplicación de hormonas para mejorar la capacidad de echar raíces.

**Utilización:** Plantar en jardines o macetas, su cultivo en parques y jardines contribuirá a su conservación ex situ.





