

Calceolaria adscendens

Lindl. ssp. *pristiphylla* (Phil.) C. Ehrhart

Capachito

Floración: 


Fructificación: 

Familia: Calceolariáceas (antes Escrofulariáceas).

Origen geográfico: Endémica de Chile.

Distribución en Chile: Regiones de Coquimbo a la del Bío-Bío.

Descripción: Arbusto siempreverde, de hasta 60 cm de altura por 40 cm de diámetro. Las ramas crecen erectas o tendidas. Hojas algo rugosas, lanceoladas a ovaladas, de 3-5 x 1 a 1,5 cm, margen aserrado a dentado, la nervadura destacada por el envés y con pelillos variables según la subespecie. Inflorescencia en cimas de hasta 22 flores, claramente distanciadas de las hojas, de color amarillo oro, con el labio superior pequeño dirigido hacia adelante, levemente comprimido lateralmente y el labio inferior mucho más grande, globoso y algo abollado por delante. Florece en verano. El fruto es una cápsula hispida con numerosas semillas pequeñas, madura en otoño.



C. adscendens se clasifica en tres subespecies que se diferencian por la cantidad y distribución de los pelos en las hojas: *C. adscendens* ssp. *adscendens* tiene pelos largos y retorcidos por la haz y muy cortos por el envés; *C. adscendens* ssp. *glandulifera*, es aterciopelada por la haz y por el envés y con glándulas rojizas por el envés y *C. adscendens* ssp. *pristiphylla*, tiene las hojas hispidas por ambas caras.

Hábitat: Crece en lugares abiertos, soleados y secos, en suelos con buen drenaje a pleno sol. Se encuentra en el matorral costero y en los claros del bosque esclerófilo.

Propagación: Se propaga por semillas, en almácigo normal en primavera o estratificado en otoño.

Utilización: Se planta en los jardines para formar parte de grupos florales en rocallas ya que crece muy bien cerca de rocas, o en macetas o jardineras. Se recomienda cultivarla en balcones de exposición norte.



