

Corynabutilon vitifolium

(Cav.) Kearney

Huella

Floración: 

Fructificación: 

Familia: Malváceas.

Origen geográfico: Endémica de Chile.

Distribución en Chile: Regiones del Bío-Bío a la de Los Lagos.

Descripción: Arbusto siempreverde, de 4 m de altura por 2 m de diámetro. Ramas erectas, pilosas. Hojas pecioladas, nervadura palmada, láminas de hasta 14 cm de longitud, 3 a 5 lobuladas, dentadas, verde claras por la haz y recubiertas de vello ceniciento por el envés. Flores de hasta 8 cm de diámetro, blancos, blanco-azuladas o rosado pálidas, cáliz con 5 sépalos, corola con 5 pétalos libres, ovalados, contornos y con dos lóbulos, estambres con sus filamentos unidos formando una columna en el centro de la flor, gineceo con 11 a 12 estilos claviformes. Florece en primavera. Fruto, una cápsula pilosa, madura en verano, semillas reniformes.

Hábitat: Crece en los claros del bosque de roble y del bosque templado-valdiviano. Se ubica en sitios asoleados, con suelos ricos en materia orgánica y humedad.

Propagación: Se propaga por semillas sembradas en primavera en almácigo normal o estratificado en otoño. De modo vegetativo se multiplica mediante estacas, a las que se les aplica hormonas para que enraícen y se plantan en su lugar definitivo a fines de invierno.

Utilización: Hermoso arbusto para jardines, de grandes flores y prolongada floración. Interesante follaje, de grandes hojas de color verde claro. Se planta de preferencia aislado para mejor lucimiento, pero se puede plantar también en forma de setos o como bordes de pequeños cursos de agua. En medicina alternativa se usa la infusión de hojas como anti-reumática y para dolores de estómago.



