

Calceolaria alba

Ruiz & Pav.

Capachito blanco

Floración:   **Fructificación:** 

Familia: Calceolariáceas (antes Escrofulariáceas).

Origen geográfico: Endémica de Chile.

Distribución en Chile: Regiones del Maule a la de La Araucanía.

Descripción: Arbusto siempreverde, de hasta 80 cm de altura y ancho variable. Ramoso desde la base con ramas erectas, casi indivisas y hojosas desde la base al ápice, pubescentes, portando en la axila de las hojas brotes cortos y hojosos. Hojas ásperas y algo pegajosas, sésiles, semi-abrazadoras, lineal-lanceoladas, de margen entero hacia la mitad superior y con 2 a 4 dientes largos a cada lado en la mitad inferior, algo rugosas y con el nervio central marcado. Inflorescencia en panículas terminales, flores de color blanco puro, labio superior pequeño y globoso, fuertemente apretado contra el inferior, también globoso y mayor. Florece de fines de primavera a comienzos del verano. El fruto es una cápsula con semillas pequeñas que maduran a fines del verano.

Hábitat: Crece en lugares abiertos y suelos con buen drenaje, a veces a orillas de caminos. Se encuentra en los faldeos de la cordillera de la Costa y en la precordillera andina.

Propagación: Se propaga en primavera por semillas en almácigo normal o estratificado en otoño. Tiende a sembrarse formando grupos de plantas.

Utilización: Se la utiliza en jardines donde se la planta para formar parte de prados florales, a la sombra de árboles de hoja caduca, o en macetas. Su uso ornamental ayuda a fomentar la conservación *ex situ* de la especie que es poco frecuente en la naturaleza.



