

Gaultheria tenuifolia

(Phil.) Sleumer

Chaura

Floración:   **Fructificación:**  

Familia: Ericáceas.

Origen geográfico: Endémica de Chile y Argentina.

Distribución en Chile: Regiones del Maule a la de Los Ríos.

Descripción: Arbusto siempreverde, de hasta 2,5 m de altura por 2 m de diámetro. Ramas erectas, angulosas, comprimidas y glabras. Hojas pecioladas, glabras, lustrosas, lineal-elípticas hasta oblongo-elípticas, lámina de 35 x 10 mm de longitud, ápice con un mucrón fuerte, márgenes con 6 a 8 dientes pequeños y redondeados; nervio central prominente por el envés. Especie dioica, flores unisexuales, axilares, colgantes, solitarias, rosado pálidas y más pequeñas que las demás especies de *Gaultheria* del área. Florece en primavera y verano. Fruto una cápsula rodeada por los lóbulos carnosos del cáliz, de color rosado, madura en verano y otoño. En el área crecen dos formas, una en Nahuelbuta y en el litoral con hojas anchas y otra en las precordilleras de los Andes y de la Costa, con hojas más estrechas y aroma a fricción muscular.

Hábitat: Crece en los márgenes de los bosques de roble y coigue, en condiciones de semisombra, pero a pleno sol hacia la zona precordillerana.

Propagación: Se propaga por semillas sembradas en otoño en almácigo estratificado. De modo vegetativo, en verano se multiplica por esquejes en cama fría aplicándoles hormonas para que enraícen.

Utilización: En jardines se planta por su follaje y sus abundantes aunque pequeñas flores. Destaca más si se la cultiva en macetas.



