

Gaultheria phillyreifolia

(Pers.) Sleumer

Chaura

Floración:   **Fructificación:** 

Familia: Ericáceas.

Origen geográfico: Endémica de Chile y Argentina.

Distribución en Chile: Regiones de O'Higgins a la de Aysén.

Descripción: Arbusto siempreverde, de hasta 2,5 m de altura por igual diámetro. Ramillas con setas (cerdas) castaño-rojizas. Hojas glabras, aovado-oblongas a lanceoladas, de 1 a 2 cm de longitud, base cuneada a redondeada, ápice acuminado con un mucrón punzante, márgenes aserrados y nervio medio prominente. Flores unisexuales, especie dioica. Inflorescencias axilares de hasta 10 flores, pedicelos péndulos de hasta 16 mm, con bractéolas. Florece en primavera y en verano. Fruto, una cápsula central coriácea a la que envuelve el cáliz carnoso y violáceo, madura desde fines del verano.

Hábitat: Crece en los claros o en sitios alterados. Forma parte de los bosques templados de tipo valdiviano y de los montanos de *Nothofagus dombevi* (coigue).

Propagación: Se propaga por semillas sembradas en otoño en almácigo estratificado. Vegetativamente se puede multiplicar en verano por esquejes subapicales en cama fría aplicando hormonas para que enraicen.

Utilización: En jardines, bordeando caminos o senderos. Se cultiva también en macetas y jardineras o bajo árboles altos.



