

Teucrium bicolor

Sm.

Oreganillo

Floración: 

Fructificación: 

Familia: Lamiáceas (Labiadas).

Origen geográfico: Endémica de Chile.

Distribución en Chile: Regiones de Coquimbo a la de La Araucanía.

Descripción: Arbusto caducifolio de verano, de hasta 1,5 m de altura por similar diámetro, de forma globosa. Ramas erectas, cuadrangulares, densas, con algunos pelos glandulares. Hojas opuestas, de tres tipos diferentes: unas 3-lobadas con el lóbulo central prominente, otras linear-lanceoladas y más rara vez, 5-lobadas; lámina de 2 a 4 cm de longitud. Inflorescencia un racimo laxo que nace en la axila de las hojas; flores blancas o rosadas con manchas púrpuras o rosado-violáceas, bilabiadas, con el labio superior muy corto, un labio inferior grande y dos lóbulos pseudolaterales; androceo con 4 estambres largos y curvos, gineceo con ovario súpero, bicarpelar con un estilo y el estigma bífido. Florece durante la primavera. El fruto es un nuculanio formado por 4 nuececillas que se dispersan individualmente, maduros en verano.

Hábitat: Crece en laderas de cerros, relativamente despejados, entre otros arbustos bajos, a pleno sol o en condiciones de semisombra, en suelos con buen drenaje y algo de materia orgánica.

Propagación: Se propaga por semillas sembradas en primavera en almácigos normales o estratificados en otoño. Entre noviembre y enero se multiplica en cama fría por esquejes subapicales a los que se le extraen las yemas florales y se les aplican hormonas para que enraícen.

Utilización: En jardinería se utiliza de preferencia aislado para que pueda lucir su forma y su abundante floración. Puede incorporarse también a grupos arbustivos bajos o cultivarse en macetas, jardineras y balcones.



