

b. *Alstroemeria philippii* Baker subsp. *adrianae* Watson & Flores

» Watson & Flores, *Herbertia* 63:102. 2009. TIPO: CHILE, Atacama, III Region, Huasco Province, about 20 km inland SE of Caleta Sarco (28°55'S - 71°23'W), ca 100 m, 6 Nov 2004, J.W. 10930. J.M. Watson & A.E. Hoffmann (Holotipo: SGO).

Descripción: Hierba perenne, rizomatosa de 30-45 cm de alto. Se diferencia de la variedad típica por los tépalos internos superiores que igualan o apenas sobrepasan a los tépalos externos y por las flores blancas con una leve tonalidad rosada.

Fenología: Se tiene información de flores y frutos obtenidos en noviembre, según la descripción original (Watson & Flores 2009).

Origen: Endémica de Chile.

Distribución geográfica y hábitat: Distribución restringida a la Región de Atacama, al interior de Caleta Sarco (28°55'S; 71°23'W) (Watson & Flores 2009).

Estado de conservación: No evaluada.

Observaciones: Watson & Flores (2015) dedican este taxón a la distinguida botánica chilena Prof. Adriana Hoffmann. En el catálogo de la Fundación R.A. Philippi (2018), este taxón es tratado como sinónimo de *A. philippii* var. *albicans* (como "*A. philippi* var. *albicans*"). Puesto que este taxón comparte su distribución geográfica con las otras dos variedades de *A. philippii*, consideramos que es mejor tratarla con el rango de variedad.



c. *Alstroemeria philippii* Baker var. *albicans* Muñoz-Schick

» Muñoz-Schick, M., Not. Mens. Mus. Nat. Hist. Nat. 352: 22. 2003. TIPO: Chile, Región de Atacama, camino Freirina a Aguada Tongoy (28°34'S – 71°12'W), 340 m, 28 oct. 2002 M. Muñoz 4227 (Holotipo: SGO 150216).

Descripción: Hierbas perennes, rizomatosas con similares características que la variedad típica. Se diferencia de esta última por ser más robusta, con hojas inferiores elípticas, pecioladas, lámina de 6,5 cm de largo por 2-2,5 de ancho, márgenes con pocas escamas y con nervios sobresalientes. Inflorescencias con 2-5 rayos. Flores con tépalos blanquecinos con mucrones atropurpúreos, los tépalos superiores internos con abundantes rayitas o sin ellas hacia la base, a veces con mancha amarilla más cerca del ápice; el tépalo inferior interno más corto que los superiores (Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz 2003).

Fenología: Florece en octubre (Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz 2003).

Origen: Endémica de Chile.

Distribución geográfica y hábitat: Se encuentra sólo en la Región de Atacama; ha sido recolectada desde Las Lozas, Huasco (28°28' S) hasta Los Bronces (28°36' S); Chacón *et al.* (2012) citan material de Isla Damas (RN Pingüino de Humboldt) (29°14'S, 71°31'W); habita en roqueríos y arenas del litoral (Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz 2003).

Estado de conservación: Vulnerable. Además de su restringida distribución, no se encuentra creciendo en áreas protegidas, ni en sitios prioritarios (Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz 2003).

