

c. *Alstroemeria hookeri* Lodd. subsp. *recumbens* Ehr. Bayer

» Ehr. Bayer, Mitt. Bot. Staatssamml. München 24: 149. 1987.

Basionimo: *Alstroemeria recumbens* Herb., Amaryllidaceae: 97. 1837. TIPO: Chile, Valparaíso, *Cumming* 384 (Holotipo: K; isotipos BM, E).

Descripción: Esta subespecie se distingue de la subespecie típica por los tépalos largamente mucronados y por su hábito decumbente. Hierba perenne, generalmente de baja estatura, casi pegada a la arena. Las flores son casi blancas hasta de color rosado intenso; tépalos externos obovado-romboidales, de 2,4-3,8 cm de largo por 0,7-1,4 cm de ancho, adelgazados en el ápice, terminando en un mucrón oscuro de hasta 8 mm de largo; tépalos internos superiores más angostos, lanceolados, con una mancha amarilla en el centro y manchas marrones; tépalo interno inferior sin manchas. Para una descripción detallada véase Bayer (1987).

Fenología: Florece desde noviembre a enero; fructifica entre diciembre y enero (Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz 2003).

Origen: Endémica de Chile.

Distribución geográfica y hábitat: Taxón con distribución restringida a las regiones de Coquimbo (Limarí, 30°10'S) y Valparaíso (32°20'S-33°31'S), desde el nivel del mar hasta los 280 m s.n.m. Crece en suelo arenoso y dunas litorales.

Estado de conservación: Ravenna *et al.* (1998) la clasifican como Vulnerable debido a la artificialización de su hábitat. Preocupación menor (LC).

