

c. *Alstroemeria ligtu* L. subsp. *splendens* Muñoz-Schick

» M. Muñoz-Schick, Not. Mens. Mus. Nat. Hist. Nat. 352: 22. 2003. TIPO: Chile, Región del Maule, Provincia de Curicó, camino Los Queñes hasta 5-7 km del Paso Vergara, 8 dic. 2001, M. L. Vial s/n (Holotipo: SGO 149006).

Sinónimos: *Alstroemeria ligtu* L. subsp. *incarnata* Ehr. Bayer, nom illeg., Mitt. Bot. Staatssaml. München 156. 1987.

Descripción: Hierbas perennes, rizomatosas, robustas, de hasta 75 cm de alto. Hojas lineares a lanceoladas, pseudopecioladas, de 12 cm de largo por 2 cm de ancho, margen con papilas de 0,3-1 mm de largo. Inflorescencias de 4-7 rayos, hasta 4-divididos. Flores de color rosado pálido a intenso; tépalos externos de 4,5-6 cm de largo por 1,5-2 cm de ancho, obovado-rómbicos; tépalos internos superiores con manchas púrpuras, alargadas y con una mancha amarilla alargada, que se prolonga casi hasta la base. Anteras café-amarillentas. Cápsula elipsoidal, de 2 cm de largo. Semillas café-rojizas de 3-4 mm de diámetro (Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz 2003).

Fenología: Florece entre diciembre y enero y fructifica desde fines de diciembre (Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz 2003).

Origen: Endémica de Chile.

Distribución geográfica y hábitat: Distribución restringida a la zona precordillerana de la Región del Maule, entre el Paso Vergara, Romeral (35°00'S) y camino a Laguna del Maule (35°55'S), entre 150 y 2.000 m s.n.m.

Estado de conservación: Se encuentra protegida en RN Bellotos del Melado, RN Siete Tazas y RN Altos de Lircay (Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz 2003).

Observaciones: Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz (2003) tratan a esta subespecie bajo el nombre de *Alstroemeria ligtu* subsp. *incarnata*, propuesto por Bayer (1987). Sin embargo, este





nombre no es válido por estar basado en un material que es sinónimo de *A. pallida* Graham. Por esta razón, Muñoz-Schick le da nuevo nombre, *Alstroemeria ligtu* subsp. *splendens* M. Muñoz (Muñoz-Schick 2003a).

Estudios citogenéticos en curso sugieren que una cuarta subespecie de *A. ligtu*, que supuestamente correspondía a la subsp. *splendens*, debe ser descrita a partir de poblaciones de la Región del Maule, que mostraron diferencias en la fórmula cariotípica, hábitat, tipo de suelo y distribución (Baeza *et al.* 2016b).

Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz (2003) y la Fundación R.A. Philippi citan esta especie para la Región de O'Higgins (Huertecillas, Colchagua), sin embargo, no disponemos de especímenes que permitan confirmar esta distribución.

