

# *Alstroemeria pulchra*

Sims

» J. Sims, Bot. Mag. 50: 2421. 1823[1822]. TIPO: CHILE, Native of Chile. Com. By J. Walker Esq., of Arnos grove Southgate, Curtis's Botanical Magazine Vol. 50, pl. 2421, 1823 (Iconotipo).

## *a. Alstroemeria pulchra* Sims var. *pulchra*

**Sinónimos:** *Alstroemeria ligtu* L. var. *pulchra* (Sims) Baker, Handbook of the Amaryllideae: 139. 1888; *Alstroemeria tricolor* Hook., Exotic Flora t. 65. 1823; *Alstroemeria flos-martinii* Ker Gawl., Bot. Reg. 9: t. 731. 1823; *Alstroemeria bicolor* Hook., Exot. Fl. 1: 95. 1824.

**Nombres comunes:** Flor del águila, mariposa de campo, flor de San Martín.

**Descripción:** Hierbas perennes, rizomatosas de hasta 1 m de alto. Hojas lineares a lanceoladas, glabras, de 2,5-12 cm de largo por 3-10 mm de ancho, retorcidas. Inflorescencia de 3-8 rayos, de 4,5-18 cm de largo, 3-5 divididos. Flores blancas, lilacinas o jaspeadas; tépalos externos de 3-4 cm de largo por 1-1,8 cm de ancho, obovado-espátulados, con los márgenes denticulados, redondeados en el ápice y terminados en mucrón de 2-8 mm de largo, verdoso o atropurpúreo; tépalos internos superiores erectos, más angostos, mucho más largos que el resto, de 3,8-5,3 cm de largo, por 1-12 mm de ancho, brevemente mucronado, con una mancha amarilla hacia el tercio superior y una mancha prupúrea apical desde la cual se extienden rayitas purpúreas hasta la base del tépalo las que se hacen más finas hasta desaparecer en la zona basal; tépalo interno inferior de forma y color semejante a los tépalos externos. Anteras verdosas en las flores más blancas, atropurpúreas en las lilacinas. Cápsula café, elipsoidal, de 1,2-1,3 cm de largo, coronada por el resto del estilo de 5-6 mm de largo; semillas café de 1,8-2 mm de diámetro.

**Fenología:** Florece entre octubre y noviembre, con frutos desde noviembre (Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz 2003).

**Origen:** Endémica de Chile.



**Distribución geográfica y hábitat:** Planta de distribución amplia, crece en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule; ha sido recolectada desde la Provincia de Choapa (Mauro), al sur de la Región de Coquimbo (31°58' S) hasta Pelluhue, Provincia de Cauquenes, Región del Maule (35°49' S). Crece en la costa, interior y precordillera, de 0-1.500 m s.n.m. Prefiere suelos duros, arcillosos en lugares soleados.

**Estado de conservación:** Preocupación menor (LC) (Ministerio del Medio Ambiente 2018). Se encuentra protegida en el Parque Nacional La Campana, RN Lago Peñuelas y RN Río Blanco (Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz 2003).

**Observaciones:** Gay (1853) menciona que en los jardines de Europa se cultiva una variedad blanca de esta especie. Como indican Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz (2003) a principios del siglo XIX fue llevada a Inglaterra para su cultivo. Sanso *et al.* (2014) la relacionan anatómicamente con *A. pelegrina* por sus hojas dorsiventrales.

En esta especie se definen, además de la variedad típica, otras dos variedades que Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz (2003) consideran dudosas. Estudios llevados a cabo con técnicas colorimétricas y morfométricas apoyan preliminarmente este punto de vista.

