

## **b. *Alstroemeria pulchra* Sims subsp. *lavandulacea***

Ehr. Bayer

» Ehr. Bayer. Mitt. Bot. Staatssamml. Muenchen 24: 187. 1987. TIPO: Chile, Región de Concepción, Provincia de Concepción, Curalí bei Santa Juana, leg. A. Rodríguez, kult. Inst. f. Syst. Bot. Univ. Muenchen, 8.7.1984 (Holotipo: M).

**Descripción:** Hierbas perennes, de hasta 40 cm de alto. Hojas linear-lanceoladas, sésiles, glabras, de 2,5-6 cm de largo, retorcidas en la base. Inflorescencia umbelada, con 2-4 rayos divididos en hasta 3 ramas, aunque por lo general sólo 2, de 1,5-4 cm de largo. Flores de color lilacino; tépalos externos de 3-4,5 cm de largo por 1,1-1,7 cm de ancho, obovado-espátulados, denticulados en el margen; tépalos internos superiores espátulados, de 3,5-4,3 por 0,8-1,1 cm, mucronados, con una franja amarilla en el tercio superior y rayitas atropurpúreas en toda su extensión; ápice con una mancha purpúrea; tépalo interno inferior similar en forma y color a los tépalos externos. Anteras amarillento-purpúreas. Cápsula de 12-14 mm de largo por 10-12 mm de diámetro. Semillas de color café, redondeadas, de 2-2,5 mm de diámetro

**Fenología:** Florece en enero y febrero, con frutos en febrero y marzo.

**Origen:** Endémica de Chile.

**Distribución geográfica y hábitat:** Sólo dos materiales fueron mencionados con precisión junto a la descripción original de esta subespecie: el espécimen

tipo, que corresponde a un ejemplar cultivado a partir de semillas recolectadas por A. Rodríguez en la localidad de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío en enero de 1983 y una planta recolectada por Hutchinson en enero de 1952 en la localidad de Los Alpes, a 4 km de Angol, Región de La Araucanía. El otro material citado dice solamente Chile australis y fue recolectado por Neger entre 1893 y 1897. El espécimen de Neger está guardado en M (München) y lleva etiqueta que lo identifica como Paratipo de *A. pulchra* subsp. *lavandulacea*. Esta planta tiene una distribución restringida, pero ha sido también recolectada recientemente en la Región del Maule, Provincia de Talca, Río Claro, 300 m al norte del puente





Río Claro, 190 m (35°10'S); Cerro Cayumanque en la Región de Ñuble y en la cordillera de Nahuelbuta (37°52'S) en la Región de la Araucanía. Crece en sitios soleados, con suelos duros y arcillosos, entre los 90 y 350 m s.n.m.

**Estado de conservación:** En Peligro (EN B1ab(iii)+2ab(iii)); no se encuentra en ningún área de protección (Ministerio del Medio Ambiente 2018). Ravenna *et al.* (1998) la clasifican como Insuficientemente Conocida.

**Observaciones:** Según la descripción original, esta subespecie se diferencia de la subespecie típica por el color lavanda de sus flores, característica que no ha sido observada en terreno o material recolectado. Los tépalos internos superiores son más largos que los externos y tienen el mismo patrón de manchas que en la subespecie típica. Esta subespecie no alcanza una altura mayor de 40 cm y los rayos de la umbela rara vez se dividen en más de dos flores. Ver también comentarios en la Clave.

