

❖ *Herbertus runcinatus* (Tayl.) Trevis



**P**lantas medianas a grandes, de 3 a 7 cm de largo, color castaño rojizo. Tallo simple o con escasas ramificaciones ventrales-intercalares, sección transversal de 12 células de diámetro. Corteza de 2 a 3 estratos de células con gruesas paredes castaño amarillas. Hojas imbricadas, asimétricas, erectas a deflexas, de 1 mm de ancho y 3 mm de largo, bifidas desde la mitad de su longitud; segmentos lanceolados, siendo el dorsal mayor. Lámina aovada. Márgenes enteros o con pocos apéndices papilosos hacia la base; células con grandes trígonos y gruesas

paredes con punteaduras. Cutícula estriada. Oleocuerpos ovoides a esféricos, refringentes, de gránulos pequeños, en número de más de 20 en las células de la nervadura. Anfigastrios simétricos, generalmente con pequeños dientes que terminan en una papila hialina. Dioicas. Androecio intercalar, bracteas y bracteolas similares a las hojas, lamina cóncava. Ginoecio terminal, bracteas y bracteolas mayores que la hojas, con márgenes aserrados. Perianto lacinado. Cápsula subsférica de 1 mm de diámetro. Eláteres triespiralados. ■

**Familia:** Herbertineae

**Distribución en Chile:**

Desde la Región de los Ríos a la Región de Magallanes. Archipiélago de Juan Fernández.

**Distribución Global:**  
Chile y Argentina.

**Singularidades:**

Preferentemente epífitas sobre troncos vivos, formando tupidos abanicos.

