

❖ *Lopidium concinnum* (Hook.F.) Wils.



**P**lantas monoicas, amarillo verdosas; tallos repententes denso tomentosos, con hojas distantes, escuarrosas, tallos secundarios de 3 a 10 cm de longitud, horizontales, subpéndulos, ascendentes o precumbentes, generalmente pinnados o bipinnados desde la base, de 1 a 2,5 cm de ancho en la parte media; ramas patentes, en un plano. Hojas laterales más o menos asimétricas, dísticas, oblongo-liguladas, acuminadas, algo ventricosas en la base, cuando secas contraídas y algo deflexas.

Anfigastrios caulinares simétricos, lanceolados a ovado-lanceolados, acuminados, con nervio muy excurrente,

limbados, márgenes planos, enteros o subenteros, los basales con el ápice algo escuarroso.

Seta breve, flexuosa, de 3 a 6 mm de longitud, lisa o apenas escabrosa en el extremo; cápsula amarillenta a rojiza, generalmente erguida, pero inclinada variablemente por la flexuosidad de la seta, de 1,5 a 2 mm de longitud por 0.5 mm de ancho, cilíndrica u obovada. Opérculo cónico, rostrado; caliptra cumulada, hendida en la base, fugaz, dientes del peristoma angosto-lanceolados, con línea media en zig-zag, estriados en la mitad inferior. Esporas finamente papilosas, de 10 a 15  $\mu$  de diámetro. ■

**Familia:** Hypopterygiaceae

**Especie con disyunción  
gondwanica**

**Observaciones:**

Especie epífita, aunque a veces crece sobre troncos en descomposición en el piso del bosque. Es un buen indicador de pristinidad de bosques.

Esta especie crece desde la Región de Valparaíso hasta la Región de Aysén, con poblaciones disyuntas en el Archipiélago de Juan Fernández.

