

❖ *Hypopterygium arbuscula* Brid.



**P**lantas dioicas, robustas, verde amarillentas a blancuzcas, en matas laxas; tallo secundario de 4 a 10 cm de longitud, con estípite grueso, no tomentoso. Hojas del estípite adpresas, cóncavas, ancho-ovadas, obtusas, con márgenes enteros, nervio corto y débil o ausente; hojas dorsales de la fronde patentes, contraídas al estado seco, asimétricas, ancho-ovadas, brevemente apiculadas. Anfigastrios simétricos, ovado u oblongo acuminados, apiculadas, con limbo de 2 a 3 seriado.

Seta recta, geniculada en el ápice de 15 a 18 mm de longitud. Cápsula inclinada a péndula, pardo rojiza, ovoidea, sin cuello, de 2 a 2,5 mm por 1,5 mm. Opérculo cónico, rostrado; caliptra acumulada, de 3 mm de longitud. Esporas globosas, sublimes, ásperas, de 10 a 14  $\mu$  de diámetro. ■

**Familia:** Hypopterygiaceae

**Especie Endémica**

**Observaciones:**

Especie presente, generalmente, sobre el piso húmedo del bosque y en troncos en descomposición formando verdaderos "minibosques". Es conocido como "paragüita del sapo" por su forma. Crece entre la Provincia de Colchagua y el Cabo de Hornos, también en el Archipiélago de Juan Fernández.

