

# *Adalia angulifera*

Mulsant, 1850

Chinita

Orden: Coleoptera

Familia: Coccinellidae



## Descripción General

Su tamaño varía entre 2,3 a 3,8 milímetros. Elitros rojos con la zona escutelar negra y dos manchas claras en la base. Sigue patrones de manchas oscuras variables, similares a *Adalia deficiens*, pero en forma generalmente mucho más angulosa, de donde viene su nombre. Protórax negro bordeado de blanco o marfil, con dos manchitas claras diagonales sobre el disco. Ápice del élitro con un pequeño borde claro, que en el margen externo del élitro se ensancha formando una notoria mancha blanquizca, de un color bastante más claro que el anaranjado de los élitros, pero que en algunos ejemplares de élitros claros, no se diferencia netamente. Meso y meta epímeros siempre color marfil, a veces el prosterno y el mesosterno parcial o totalmente claros.

## Hábitat y rol trófico

Son depredadores de otros insectos en todos sus estados ontogenéticos. Durante su desarrollo, esta especie de Coccinellidae pasa por 4 estadios larvarios, conocidos como I, II, III y IV, el primero de los cuales corresponde a la larva que eclosiona del huevo, el último a la larva que pupará. Sin embargo, se ha documentado en esta especie, en crías en laboratorio, de 3 a 5 estadios larvales, dependiendo de la alimentación.

