

Battus polydamas

Scopoli, 1777

Papilio, Batus

Orden: **Lepidoptera**
Familia: **Papilionidae**



Descripción General

Mariposa con gran envergadura alar de 75 a 105 mm. Cabeza con pelos largos y rostro amarillo. Cuerpo negro con manchas naranjas en los costados del tórax y abdomen. Alas negras grandes con manchas amarillas en su cara superior y la inferior dominada por manchas blanco grisáceo, amarillo claro y rojas. Con patas largas y sin dimorfismo sexual.

Cabeza con rostro con pelos largos negros y blancos, clipeo amarillo, ojos negros grandes lustrosos y antenas negras largas ensanchadas en los últimos segmentos. Tórax y abdomen cubiertos en su parte dorsal y ventral por una densa y larga pilosidad negra brillante y en los costados por pilosidad del mismo tipo, pero amarilla anaranjada. Patas largas y negras. Alas anteriores en su cara superior, negras, con 9 a 10 manchas externas amarillo cremoso, las cuales son más anchas en la cara inferior; las posteriores en su cara superior también negras, con 6 a 7 manchas amarillo cremoso, con prolongaciones negras y bordes amarillo.

Hábitat y rol trófico

Si bien es una especie nativa del hemisferio norte de América e introducida en Chile. la hemos considerado por su tamaño y colores vistosos.

Los adultos vuelan desde inicios de primavera hasta fines de verano, donde son más escasos, principalmente sobre la vegetación que ocupa laderas soleadas. Se aparean sobre las flores. La oviposición se realiza exclusivamente sobre la planta llamada "oreja de zorro". La pupa cuelga de las ramillas o piedras cercanas al hospederio. Algunos años presenta explosiones poblacionales. Habita en ambientes esclerófilos. Los adultos son activos voladores observándoseles revolotear y alimentándose sobre un amplio espectro de especies en flor.

